

IMPFKALENDER

Sprache: Deutsch

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2024. www.stiko.de



| IMPfung | ALTER | in Wochen: | | | in Monaten | | | | | | in Jahren | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---|----|------------|-----------------|-----|----|-------|----|-----------|-----|---------------------------------|--------|------|-------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--|----|--|--|--|--|
| | | 6 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 11* | 12 | 13-14 | 15 | 16-23 | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-14 | 15-16 | 17 | ab 18 | ab 60 | | | | | | | |
| | | U4 | | | U5 | | | U6 | | | U7 | | | U7a/U8 | | U9 | | U10 | | U11/J1 | | J2 | | | | |
| Rotaviren | | G1 ^a | | G2 | (G3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tetanus ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | N | | | A1 | N | A2 | | N | A ^f | | | | | | | | | |
| Diphtherie ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | N | | | A1 | N | A2 | | N | A ^f | | | | | | | | | |
| Pertussis ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | N | | | A1 | N | A2 | | N | A3 ^f | N | | | | | | | | |
| Haemophilus influenzae Typ b ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliomyelitis ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | N | | | | | | A1 | | N | | | | | | | | | |
| Hepatitis B ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokken ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningokokken-B ^d | | G1 | N | G2 | N | G3 ^d | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masern | | | | | | | G1 | N | G2 | | | N | | | | | | S ^g | | | | | | | | |
| Mumps, Röteln | | | | | | | G1 | N | G2 | | | N | | | | | | | | | | | | | | |
| Varizellen | | | | | | | G1 | N | G2 | | | N | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningokokken C | | | | | | | G1 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humane Papillomviren | | | | | | | | | | | | | G1 ^e G2 ^e | | N | | | | | | | | | | | |
| COVID 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | G ⁱ S ⁱ | | | | | | | | | |
| Herpes zoster | | | | | | | | | | | | | | | | | G1 ^j G2 ^j | | | | | | | | | |
| Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | S (jährlich) | | | | | | | | | |

Nächste Impftermine



ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG
(in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG
(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung
(J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d** 3 Dosen im Alter von 2 bis 23 Monaten, ab 24 Monaten besteht die Impfserie aus 2 Dosen
- e** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- f** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei

- entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- g** Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- h** Impfung mit PCV20.
- i** Für den Schutz von Personen ohne Grunderkrankung sind (mindestens) 3 Antigen-Kontakte nötig, davon mindestens 1 als Impfung.
- j** Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.